




ИНСТРУКЦИЯ

по применению ЛАРИКАРВИТА для производства комбикормов и кормовых смесей для обогащения рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, бета-каротином, хлорофиллом и флавоноидами с целью повышения сохранности, продуктивных и воспроизводительных качеств (организация-производитель: ЗАО «ПЕТРОХИМ», г. Белгород)

И. Общие сведения

1. Ларикарвит (Laricarvit) — концентрат каратиновосодержащий кормовой для обогащения рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, бета-каротином, хлорофиллом и флавоноидами с целью повышения сохранности, продуктивных и воспроизводительных качеств
2. Ларикарвит содержит в 1 кг в качестве действующих веществ: бета-каротин - не менее 1700 мг/кг, биофлавоноидный комплекс лиственницы - не менее 10 000 мг/кг, комплекс микроэлементов в хелатной форме, а также наполнитель - диоксид кремния - до 1 кг. Не содержит генно-модифицированных продуктов. Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм действующих в РФ.
3. По внешнему виду Ларикарвит представляет собой порошок от светло-серого до бурого цвета.
4. Выпускают расфасованным по 1-10 кг в бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, либо по 1 кг в запаянные полиэтиленовые пакеты.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: организации- производителя, ее товарного знака и адреса, названия, назначения, способа применения и массы нетто, состава и гарантированных показателей, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, номера государственной регистрации, знака соответствия, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке производителя в помещениях закрытого типа, в защищенном от света месте, при температуре от минус 25°C до 25°C Срок хранения — 12 месяцев от даты изготовления.

Нельзя использовать по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

1. Ларикарвит обладает выраженной биологической активностью, благодаря наличию в нем провитамина А (бета-каротина), хлорофилла и биофлавоноидов лиственницы (дигидрокверцетина).

Ненасыщенная структура бета-каротина позволяет его молекулам адсорбировать свет и предотвращать накопление свободных радикалов и активных форм кислорода. Бета-каротин подавляет выработку свободных радикалов. Предполагается, что тем самым он защищает клетки иммунной системы от повреждения свободными радикалами и может улучшать состояние иммунитета. Дигидрокверцетин — является эталонным антиоксидантом. Он обладает мощным противовоспалительным и противоаллергенным свойствами, укрепляет и восстанавливает соединительную ткань, способствует снижению уровня холестерина, укрепляет сосуды и капилляры, улучшает микроциркуляцию крови, препятствует образованию тромбов, снижает воспалительные явления в простате. Хлорофилл укрепляет иммунную систему, поддерживает и

стимулирует функции кровеносной системы, а также способствует обновлению тканей и быстрому заживлению ран.

Использование добавки способствует росту продуктивности сельскохозяйственных животных, повышению сопротивляемости организма инфекциям, благоприятному формированию органов репродукции, подавлению интоксикации при случайных отравлениях животных и снижению негативного влияния лекарственных препаратов.

III Порядок применения

1. Ларикарвит - применяется для обогащения рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, бета-каротином, хлорофиллом и флавоноидами с целью повышения сохранности, продуктивных и воспроизводительных качеств.
2. Вводят в корма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

Нормы ввода:

Виды животных	Дозировка, г/т корма
Цыплята до 4 недель	1000
Цыплята старше 4 недель	1000-1500*
Поросята до 8 недель	1000-1250*
Свиньи живой массы до 50 кг	1000
Свиньи на откорме	1000-1250*
Супоросные и подсосные свиноматки	1250 – 1500*
Телята до 3 месяцев	1000
Лактирующие коровы	1000-2000*

*Для удобства указанные дозировки можно применять в количестве 1 кг, но с корректирующим значением каротина. Для обеспечения равномерного распределения Ларикарвита при внесении в корм следует применять ступенчатое смешивание.

3. Ларикарвит совместим со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.
4. Корма с введенной в них кормовой добавкой нельзя подвергать воздействию температур свыше 35° С.
5. Побочных явлений и осложнений при применении Ларикарвита в соответствии с инструкцией по применению не выявлено, противопоказаний не установлено.
6. Продукцию животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки Ларикарвит можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

1. При работе с Ларикарвитом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Необходимо использовать спецодежду, противопылевые респираторы, резиновые перчатки, защитные очки и применять противопылевую вентиляцию.
2. Избегать попадания кормовой добавки в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза - промыть большим количеством проточной воды. При попадании на кожу - промыть водой с мылом.
3. Ларикарвит следует хранить в недоступном для детей месте.

Инструкция по применению разработана ЗАО «ПЕТРОХИМ», Российская Федерация[^]. Белгород, ул. Рабочая, 14.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер № ПВР – 2 – 9.11/02732

ВИТАМИННО- КОРМОВАЯ ДОБАВКА ЛАРИКАРВИТ

Временное наставление по применению

ЛАРИКАРВИТ- Концентрат каротиносодержащий кормовой, содержащий: бета-каротин, Биофлавоноидный комплекс лиственницы - не менее 10000мг/кг по дигидрокверцетину, микроэлементы в хелатной форме. Физиологическое действие обусловлено действием входящих в нее компонентов: обеспечивает увеличение привесов, снижение заболеваемости, повышение устойчивости к стрессам, нормальное формирование репродуктивных органов, выведение токсических веществ, обладает капилляро- гастро-, гепатопротекторным действиями.

Присутствие наряду с бета-каротином других природных каротиноидов обеспечивает наряду с фармакологическим эффектом, достижение высоких потребительских качеств товарной продукции: окрашивания тушки, желтка яиц.

Рекомендуется для всех видов животных в качестве добавки к кормам в дозировках 0,05-0,2г на кг массы животного в течение 10-20 дней.

При применении на молодых животных (поросята-отъемыши, телята, цыплята с 5-суточного возраста и т.д.) обеспечивает последующее быстрое развитие животных и снижение применения лекарственных веществ .